

VACCINATION DES PATIENTS SOUS CHIMIOThERAPIE

Cher (ère) confrère,

La maladie et le traitement que votre patient reçoit (ou a reçu) diminuent ses défenses vis-à-vis des infections. Il est fortement recommandé de le vacciner (**vaccins inactivés uniquement**) :

L'Institut Curie vous recommande la vaccination des patients, selon le protocole ci-dessous :

➤ Vaccins contre la grippe et le pneumocoque

- **Le vaccin anti-grippal** est recommandé à l'automne et en période épidémique.
Chez l'adulte : 1 injection ; une revaccination sera réalisée à au moins un mois d'intervalle en période épidémique chez les patients vaccinés en début de saison et encore sous traitement par chimiothérapie.
- **La vaccination contre le pneumocoque** doit se faire avec le vaccin conjugué 13-valent suivi du vaccin polysidique 23-valent à au moins 2 mois d'intervalle **>M2**

Pour les patients déjà vaccinés contre le pneumocoque:

- Ceux qui n'ont reçu antérieurement que le vaccin 23-valent pourront recevoir une injection du vaccin conjugué 13-valent, au moins 1 an après l'injection du 23-valent.
- Ceux vaccinés avec la séquence 13 puis 23-valent pourront recevoir une nouvelle injection du 23-valent, 5 ans après la précédente injection de 23-valent.

Les vaccins grippe et pneumocoque peuvent être réalisés en même temps, dans des sites distincts.

Il est important également de sensibiliser l'entourage à la vaccination antigrippale.

➤ Vaccins du Calendrier vaccinal




Le patient doit être à jour des vaccins dTP (+/- coqueluche si contact avec des enfants).

Une dose de rappel doit être administrée après l'arrêt du traitement : à 3 mois en cas de tumeurs solides **M3**, 6 mois en cas d'hémopathies **M6**.

➤ Quand vacciner votre patient ?

- **Avant le début de la chimiothérapie**, pour des raisons d'efficacité (au moins 10 jours). Toutefois, il est essentiel de vacciner le patient **à tous les stades de sa prise en charge**, le seul risque étant une moindre efficacité.
- **Pour les patients déjà sous chimiothérapie** : en intercure

➤ Synthèse des recommandations

	Avant ou en cours de traitement	Après la fin du traitement
dTP +/- Coqueluche dTP [Revaxis®] ou dTP coqueluche [Repevax® ou Boostrix®]	Une dose de vaccin dTP Si dernier rappel > 10 ans + valence coqueluche si contact avec enfants	Tumeurs solides M3 Hémopathie maligne M6
Pneumocoques [Prévenar 13® ou Pneumovax 23®]	Schéma de vaccination à 2 doses M0  + >M2  Prévenar 13® + Pneumovax 23®	Rappel en fonction des facteurs de risques individuels
Grippe saisonnière	 Une dose de vaccin tous les ans, au mieux avant (ou pendant) l'épidémie annuelle (malade et entourage) + rappel à 1 mois	

Nous vous remercions par avance de votre prise en charge.

Fait à le/...../.....

Cachet et signature du médecin :